

Günter M. Gramlich




Mathematik-Studienhilfen

Lineare Algebra

Eine Einführung

$$y = y_S \oplus y_N$$



$\mathbb{R}^m$

$$x = x_Z \oplus x_N$$

5., überarbeitete Auflage

HANSER



Ihr Plus – digitale Zusatzinhalte!

Auf unserem Download-Portal finden Sie zu diesem Titel kostenloses Zusatzmaterial. Geben Sie dazu einfach diesen Code ein:

plus-ihd45-a89tb

plus.hanser-fachbuch.de



Bleiben Sie auf dem Laufenden!

Hanser Newsletter informieren Sie regelmäßig über neue Bücher und Termine aus den verschiedenen Bereichen der Technik. Profitieren Sie auch von Gewinnspielen und exklusiven Leseproben. Gleich anmelden unter

www.hanser-fachbuch.de/newsletter

Mathematik–Studienhilfen

Herausgegeben von

Prof. Dr. Bernd Engelmann

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig,

Fachbereich Informatik, Mathematik und Naturwissenschaften

Zu dieser Buchreihe

Die Reihe Mathematik-Studienhilfen richtet sich vor allem an Studierende technischer und wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtungen an Fachhochschulen und Universitäten.

Die mathematische Theorie und die daraus resultierenden Methoden werden korrekt aber knapp dargestellt. Breiten Raum nehmen ausführlich durchgerechnete Beispiele ein, welche die Anwendung der Methoden demonstrieren und zur Übung zumindest teilweise selbstständig bearbeitet werden sollten.

In der Reihe werden neben mehreren Bänden zu den mathematischen Grundlagen auch verschiedene Einzelgebiete behandelt, die je nach Studienrichtung ausgewählt werden können. Die Bände der Reihe können vorlesungsbegleitend oder zum Selbststudium eingesetzt werden.

Bisher erschienen:

Gramlich, *Lineare Algebra*

Knorrenschild, *Numerische Mathematik*

Knorrenschild, *Vorkurs Mathematik*

Martin, *Finanzmathematik*

Nitschke, *Geometrie*

Preuß, *Funktionaltransformationen*

Sachs, *Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik*

Stingl, *Operations Research—Lineare Optimierung*

Tittmann, *Graphentheorie*

Günter M. Gramlich

Lineare Algebra

Eine Einführung

5., überarbeitete Auflage

HANSER

Autor:

Günter M. Gramlich, Technische Hochschule Ulm



Alle in diesem Buch enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und mit Sorgfalt geprüft und getestet. Dennoch sind Fehler nicht ganz auszuschließen. Aus diesem Grund sind die im vorliegenden Buch enthaltenen Informationen mit keiner Verpflichtung oder Garantie irgendeiner Art verbunden. Autor(en, Herausgeber) und Verlag übernehmen infolgedessen keine Verantwortung und werden keine daraus folgende oder sonstige Haftung übernehmen, die auf irgendeine Weise aus der Benutzung dieser Informationen – oder Teilen davon – entsteht. Ebenso wenig übernehmen Autor(en, Herausgeber) und Verlag die Gewähr dafür, dass die beschriebenen Verfahren usw. frei von Schutzrechten Dritter sind. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte, auch die der Übersetzung, des Nachdruckes und der Vervielfältigung des Buches, oder Teilen daraus, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

© 2021 Carl Hanser Verlag München;

Internet: www.hanser-fachbuch.de

Lektorat: Dipl.-Ing. Natalia Silakova-Herzberg

Herstellung: Anne Kurth

Satz: Günther M. Gramlich

Titelbild: © Günther M. Gramlich

Covergestaltung: Max Kostopoulos

Coverkonzept: Marc Müller-Bremer, www.rebranding.de, München

Druck und Binden: Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg

Printed in Germany

Print-ISBN: 978-3-446-47188-7

E-Book-ISBN: 978-3-446-47216-7

Vorwort

Vorlesungen zur Linearen Algebra gehören zu den Pflichtveranstaltungen der mathematischen Grundausbildung von allen Studierenden der ingenieurwissenschaftlichen, wirtschaftswissenschaftlichen, naturwissenschaftlichen, mathematischen sowie informations- und kommunikationstechnischen Fachrichtungen an Fachhochschulen, Hochschulen und Universitäten.

Die Lineare Algebra hat sich aus zwei unterschiedlichen Teilgebieten entwickelt: der Analytischen Geometrie und dem Studium linearer Gleichungssysteme. Die Lineare Algebra ist ein faszinierendes Gebiet innerhalb der Mathematik mit großem Anwendungspotenzial. Sie lässt sich aus drei Blickpunkten betrachten. Erstens: Geometrischer Blickpunkt. Die Analytische Geometrie modelliert geometrische Objekte mithilfe der Linearen Algebra. Zweitens: Arithmetischer Blickpunkt. Modellieren und rechnen mit linearen Gleichungen, Vektoren und Matrizen sind für praktische Probleme, für Computermathematik (Numerische Mathematik) und für Computersimulationen von großer Bedeutung. Drittens: Algebraischer Blickpunkt. In der strukturbetonten Theorie der Vektorräume tritt das Wesen der Mathematik als Strukturwissenschaft besonders hervor. Ich habe mich bemüht, in dieser Einführung alle drei Blickpunkte zur Geltung kommen zu lassen.

Das Ihnen vorliegende Buch zur Linearen Algebra gibt eine konzentrierte Darstellung wesentlicher Begriffe, Ergebnisse und Methoden und stellt das Üben, Trainieren und Verständnis dieser anhand vieler Beispiele mit Lösungen in den Mittelpunkt. Das Buch eignet sich daher insbesondere auch zum Selbststudium, zur Prüfungsvorbereitung und zur Klausurvorbereitung.

Matrizen, lineare Gleichungssysteme, Vektorräume und lineare Abbildungen sind wichtige Begriffe der Linearen Algebra. Zentrale Gleichungen der Linearen Algebra sind lineare Gleichungen und Eigenwertgleichungen. Es ist faszinierend, wie viel man über diese beiden Gleichungstypen sagen (und lernen) kann. Viele Anwendungen sind diskret und nicht kontinuierlich, digital anstatt analog und linearisierbar anstatt unberechenbar und chaotisch. Dann aber sind Matrizen und Vektoren die geeigneten Objekte und die Lineare Algebra die richtige Sprache; an die Stelle von kontinuierlichen Funktionen treten Vektoren.

Das Buch ist so angelegt, dass es in der vorgegebenen Reihenfolge, sicher aber mit häufigem Zurückblättern, bearbeitet werden kann. Die mathematischen Sätze sind durchnummeriert. Eine Definition erkennt man nicht daran, dass davor das Schlüsselwort Definition steht, sondern daran, dass der zu definierende Begriff **fett** gedruckt ist. An vielen Beispielen und Aufgaben können Sie Begriffe und Methoden der Linearen Algebra trainieren. Lösungen von Beispielen und Aufgaben sind immer Musterlösungen, das

heißt, auch andere Lösungen oder Lösungswege sind möglich. Bei den Aufgaben ich mich bemüht, keine unnötigen Tricks einzubauen, sondern Ihnen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Das Sachwortverzeichnis ist recht ausführlich angelegt, um das Auffinden von Definitionen und Erläuterungen beim Zurückblättern oder bei der späteren Arbeit mit dem Buch zu erleichtern. Beweise habe ich geführt, wenn sie zum Verständnis der betrachteten Zusammenhänge beitragen. Oft werden mathematische Sätze jedoch nur formuliert und ihre Bedeutung wird an Beispielen aufgezeigt. Sind Sie an Beweisen interessiert, die ich nicht geführt habe, so verweise ich Sie auf die angegebene Literatur. In diesem Sinn kann das vorliegende Buch die mathematisch und logisch formal präzise und umfangreiche Literatur aus dem Bereich der Linearen Algebra nicht an jeder Stelle ersetzen, und will es auch gar nicht. Wo immer es möglich ist, habe ich versucht, Definitionen und Sätze mit Beispielen zu motivieren und Querbezüge in ihren sachlichen Kontext einzuordnen. Auch möchte ich die Schönheit, Eleganz, Faszination und Nützlichkeit übertragen, die dieses Teilgebiet der Mathematik ausstrahlt.

Die Menge der natürlichen Zahlen $\{1, 2, 3, \dots\}$ wird mit $\mathbb{N}$ bezeichnet und die Menge der reellen Zahlen heißt $\mathbb{R}$. Beweise, Beispiele und Algorithmen habe ich mit dem nicht ausgefüllten Quadratzeichen $\square$ abgeschlossen. Statt $1, 2, \dots, n$ schreibe ich auch gerne $1 : n$.

In den ersten beiden Kapiteln machen wir uns mit reellen geordneten Tupel und Matrizen vertraut. Das nächste Kapitel behandelt lineare Gleichungssysteme. Vektorräume, Basen und Dimensionen sind zentrale Begriffe der Linearen Algebra; sie werden allgemein eingeführt und definiert (Vektorraumaxiome). Ansonsten arbeite ich meistens mit dem endlich dimensionalen Vektorraum-Prototyp $\mathbb{R}^n$ und dem natürlichen Skalarprodukt. Mit den vier Fundamentärräumen einer Matrix lassen sich die grundlegenden Begriffe der Linearen Algebra gut verstehen. Lineare Abbildungen, Eigenwerte und Eigenvektoren sind klassische Themen; diesen sind jeweils eigene Kapitel gewidmet.

Das vorliegende Buch habe ich vollständig in $\text{\LaTeX}$ mit der Hauptklasse `scrbook` des KOMA-Script Pakets erstellt, das Literaturverzeichnis mit `biblatex`, den Index mit `MakeIndex`, und alle Bilder mit `PSTricks`. Ohne diese schönen Tools wäre dies alles viel schwieriger oder gar unmöglich gewesen.

Ich danke allen Studenten, Kollegen und Interessierten, die durch Hinweise auf Druck- oder Denkfehler, oder einfach durch ihr fachliches oder didaktisches Interesse an diesem Buch und seinem Inhalt, zur Verbesserung des Textes beigetragen haben. Danke an das professionelle Team vom CARL HANSER Verlag Frau SILAKOVA-HERZBERG, Frau KUBIAK und Frau KURTH für Hinweise zur Gestaltung des Buches.

Für jede Anregung, nützlichen Hinweis oder Verbesserungsvorschlag bin ich dankbar. Sie können mich über Post oder E-Mail Guenther.Gramlich@thu.de erreichen.

In dieser überarbeiteten Auflage habe ich an zahlreichen Stellen Änderungen, Glättungen, Verbesserungen, Erweiterungen und Neubearbeitungen vorgenommen.

Ulm, im Sommer 2021

Günter M. Gramlich

Inhaltsverzeichnis

1	Reelle geordnete Tupel	11
1.1	Rechnen mit reellen Tupeln	11
1.2	Visualisierungen von reellen Tupeln	14
1.3	Weitere Bemerkungen und Hinweise	15
1.4	Aufgaben	16
2	Reelle Matrizen	19
2.1	Spezielle Matrizen	21
2.2	Rechnen mit Matrizen	23
2.3	Isomorphismen und Identifikationen	33
2.4	Zum Rechnen mit Matrizen	34
2.5	Potenzen von Matrizen	44
2.6	Inverse Matrizen	46
2.7	Weitere Bemerkungen und Hinweise	48
2.8	Aufgaben	49
3	Reelle lineare Gleichungssysteme	53
3.1	GAUSS-Verfahren	56
3.2	Eine weitere Matrizenform	68
3.3	Zur Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems	69
3.4	Führende und freie Variablen	70
3.5	Unter-, über- und bestimmte Systeme	70
3.6	Der Rang einer Matrix	72
3.7	Zeilen- und Spaltenbild	78
3.8	Beispiele	78
3.9	Quadratische lineare Gleichungssysteme und inverse Matrizen	82
3.10	Weitere Bemerkungen und Hinweise	83
3.11	Aufgaben	84
4	Reelle Vektorräume	89
4.1	Die Vektorraum-Definition	89
4.2	Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$	92
4.3	Weitere Beispiele von reellen Vektorräumen	93
4.4	Untervektorräume	94
4.5	Nullräume und homogene lineare Gleichungssysteme	97
4.6	Linearkombinationen, lineare Hülle, Erzeugendensystem	100
4.7	Spaltenraum und Zeilenraum	105
4.8	Die vier Fundamentalräume einer Matrix	105

4.9	Spaltenräume und lineare Gleichungssysteme	107
4.10	Lineare Unabhängigkeit und Abhängigkeit	109
4.11	Basis und Dimension	112
4.12	Koordinaten, Koordinatenvektoren und Komponenten	117
4.13	Lineare Gleichungssysteme und der Vektorraum $\mathbb{R}^n$	120
4.14	Basen und Dimensionen für die vier Fundamentalmräume	123
4.15	Summe und direkte Summe von Untervektorräumen	133
4.16	Weitere Bemerkungen und Hinweise	135
4.17	Aufgaben	137
5	Lineare Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$	141
5.1	Abbildungen	141
5.2	Lineare Abbildungen	142
5.3	Weitere Beispiele von linearen Abbildungen	148
5.4	Kern und Bild linearer Abbildungen	150
5.5	Verkettungen und Matrizenmultiplikationen	154
5.6	Lineare Umkehrabbildungen und inverse Matrizen	156
5.7	Weitere Verknüpfungen	158
5.8	Lineare Abbildungen und lineare Gleichungssysteme	159
5.9	Weitere Bemerkungen und Hinweise	160
5.10	Aufgaben	161
6	Der Vektorraum $\mathbb{R}^n$ mit Skalarprodukt	163
6.1	Länge, Abstand, Winkel und Projektion	165
6.2	Orthogonal- und Orthonormalbasen	171
6.3	Orthogonale Teilmengen und orthogonale Summen	176
6.4	Orthogonale Komplemente	178
6.5	Über die vier Fundamentalmräume	180
6.6	Das Kreuzprodukt im $\mathbb{R}^3$	183
6.7	Weitere Bemerkungen und Hinweise	184
6.8	Aufgaben	185
7	Spezielle lineare Abbildungen von $\mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^m$	187
7.1	Transponierte Abbildungen	187
7.2	Symmetrische Abbildungen	189
7.3	Orthonormale Matrizen	191
7.4	Orthonormale Abbildungen	194
7.5	Idempotente Abbildungen	196
7.6	Projektive Abbildungen	197
7.7	Orthogonale projektive Abbildungen	200
7.8	Weitere Bemerkungen und Hinweise	209
7.9	Aufgaben	210
8	Reelle Determinanten	211
8.1	Die Determinante einer $(2, 2)$ -Matrix	211

8.2	Verallgemeinerung auf (n, n) -Matrizen	213
8.3	Determinanten, Invertierbarkeit und lineare Gleichungssysteme	217
8.4	Weitere Bemerkungen und Hinweise	219
8.5	Aufgaben	219
9	Reelle Eigenwerte und Eigenvektoren	221
9.1	Definitionen und erste Eigenschaften	221
9.2	Bestimmung von Eigenwerten und Eigenvektoren	224
9.3	Eigenräume und Basen von Eigenvektoren	228
9.4	Basen von Eigenvektoren und Diagonalisierbarkeit	232
9.5	Orthonormale Basen von Eigenvektoren	235
9.6	Orthogonale Basen von Eigenvektoren und orthogonale Eigenräume	239
9.7	Weitere Bemerkungen und Hinweise	239
9.8	Aufgaben	240
	Literaturverzeichnis	243
	Stichwortverzeichnis	245

1 Reelle geordnete Tupel

Wir erinnern an die Begriffe Produktmenge und geordnete Tupel. Ist $n \in \mathbb{N}$ und sind $A_1, \dots, A_n$ Mengen, so heißt die Menge $A \times \dots \times A_n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in A_1, \dots, a_n \in A_n\}$ Produktmenge (kartesisches Produkt, Kreuzmenge, Mengenprodukt) der Mengen A_1 bis A_n . Die Elemente der Menge $A \times \dots \times A_n$ heißen geordnete Tupel oder kurz Tupel. Bei Tupel kommt es auf die Reihenfolge an. Zwei Tupel $(a_1, \dots, a_n)$ und $(b_1, \dots, b_n)$ sind genau dann gleich, wenn $a_1 = b_1, \dots, a_n = b_n$ gilt. Es kommt auch vor, dass Tupel als Listen bezeichnet werden.

Von besonderer Bedeutung ist nun der Fall, wenn A_j für jedes $j \in \{1, \dots, n\}$ gleich der Menge der reellen Zahlen $\mathbb{R}$ ist. In diesem Fall schreibt man für $\mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}$ kurz $\mathbb{R}^n$. Somit gilt

$$\mathbb{R}^n = \{(a_1, \dots, a_n) \mid a_1 \in \mathbb{R}, \dots, a_n \in \mathbb{R}\}.$$

Die Elemente von $\mathbb{R}^n$ sind **reelle geordnete Tupel**. Ist $(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$ ein reelles Tupel, so heißen die Zahlen $a_1, \dots, a_n$ **Koordinaten (Einträge, Komponenten)** von $(a_1, \dots, a_n)$. Je nach Wahl von $n \in \mathbb{N}$ haben diese Tupel eigene Namen: Für $n = 2$: reelles Paar oder reelles Dupel, für $n = 3$ reelles Tripel, für $n = 4$ reelles Quadrupel, für $n = 5$ reelles Quintupel, usw. Verwenden wir einen Buchstaben für ein Element aus $\mathbb{R}^n$, dann verwenden wir oft denselben Buchstaben mit einem Index, wenn die Koordinaten angezeigt werden sollen. Zwei reelle n -Tupel $a = (a_1, \dots, a_n)$ und $b = (b_1, \dots, b_n)$ sind genau dann gleich, wenn die entsprechenden Koordinaten gleich sind, also $a_j = b_j$ für alle $j = 1, 2, \dots, n$ ist.

Beispiel 1.1 Hier sind ein paar Elemente aus der Produktmenge $\mathbb{R}^2$: $(3, 2)$, $(1, -1)$, $(1, 0)$, $(0, 1)$, (π, e) , $(\cos(\pi/4), \sin(\pi/4))$. Bitte beachten Sie: Es ist $\{1, 2\} = \{2, 1\}$, aber $(1, 2) \neq (2, 1)$, und $\{3, 3\} = \{3\}$, aber $(3, 3) \neq (3)$. $\square$

1.1 Rechnen mit reellen Tupeln

Sind $a = (a_1, \dots, a_n)$ und $b = (b_1, \dots, b_n)$ reelle Tupel aus $\mathbb{R}^n$, so definiert man

$$a \oplus b = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n).$$

Dies ist die **Tupeladdition** von reellen Tupeln in $\mathbb{R}^n$. Das Symbol $\oplus$ kennzeichnet die neue Verknüpfung Addition in der Menge $\mathbb{R}^n$. Es wird nur hier in der Definition verwendet, damit der Unterschied zur gewöhnlichen Addition $+$ in den reellen Zahlen

$\mathbb{R}$ deutlich wird. Statt $\oplus$ schreiben wir in Zukunft einfach $+$. Die Tupeladdition ist eine mathematische Abbildung von $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ nach $\mathbb{R}^n$ mit $(a, b) \mapsto a + b$. Das **Nulltupel** in $\mathbb{R}^n$ ist $o = (0, \dots, 0)$. Das Nulltupel o hat die Eigenschaft, dass es bezüglich der Addition neutral ist, denn es ist $a + o = a$, wobei a irgendein Element aus $\mathbb{R}^n$ ist. Aus diesem Grund wird das Nulltupel auch **neutrales Element** oder **neutrales Tupel** der Tupeladdition genannt. Das zu $a = (a_1, \dots, a_n)$ **negative Tupel** oder **Gegentupel** ist das Tupel $-a = (-a_1, \dots, -a_n)$ und es ist $a + (-a) = o$. Das Nulltupel aus $\mathbb{R}^n$ schreiben wir auch als o_n , um anzudeuten, dass es n Nullkoordinaten hat. Die **Tupelsubtraktion** in $\mathbb{R}^n$ lässt sich auf die reelle Tupeladdition zurückführen; es ist $a \ominus b = a + (-b)$. Statt $\ominus$ schreibt man $-$. Es ist also $a - b = (a_1 - b_1, \dots, a_n - b_n)$, das heißt das Differenztuplel $a - b$ erhält man durch Subtraktion der Koordinaten in b von den entsprechenden Koordinaten in a . Die Tupelsubtraktion ist eine Abbildung von $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $(a, b) \mapsto a - b$.

Die Multiplikation einer reellen Zahl r mit einem reellen Tupel $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, also $r \odot a$, ist das Tupel, das durch Multiplikation jeder Koordinate von a mit r gewonnen wird:

$$r \odot a = (r \cdot a_1, \dots, r \cdot a_n).$$

Man nennt es **reelle Multiplikation (skalare Multiplikation)**. Statt $\odot$ schreibt man $\cdot$. Den Punkt zwischen einer reellen Zahl und einem Tupel lässt man oft weg, also gilt $r \cdot a = ra$. Die reelle Multiplikation ist eine Abbildung von $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ mit $(r, a) \mapsto ra$. Die Reihenfolge der Operationen ist $\cdot, +, -$ (Punkt vor Strich).

Beispiel 1.2 Es sind die Tupel $a = (1, 2) \in \mathbb{R}^2$ und $b = (3, -4) \in \mathbb{R}^2$ gegeben. Ferner ist $r = 2$. Bestimmen Sie das Tupel $a + b$, das Tupel ra und das Tupel $a - b$.

Lösung: Die Summe ist $a + b = (1, 2) + (3, -4) = (1 + 3, 2 + (-4)) = (4, -2) \in \mathbb{R}^2$. Das skalare Produkt ist $ra = 2(1, 2) = ((2)(1), (2)(2)) = (2, 4) \in \mathbb{R}^2$ und die Subtraktion ergibt $a - b = (-2, 6) \in \mathbb{R}^2$. $\square$

Für reelle Tupel lassen sich grundlegende und nützliche Rechenregeln aufstellen.

Satz 1.1 *Es sind $n \in \mathbb{N}$, $r, s \in \mathbb{R}$, $o \in \mathbb{R}^n$ das Nulltupel und $a, b, c \in \mathbb{R}^n$. Dann gelten die folgenden acht Rechenregeln:*

$$(a) \quad a + b = b + a$$

$$(e) \quad r \cdot (a + b) = (r \cdot a) + (r \cdot b)$$

$$(b) \quad a + (b + c) = (a + b) + c$$

$$(f) \quad (r + s) \cdot a = (r \cdot a) + (s \cdot a)$$

$$(c) \quad a + o = a$$

$$(g) \quad r(s \cdot a) = (rs) \cdot a$$

$$(d) \quad a + (-a) = o$$

$$(h) \quad 1 \cdot a$$

Aufgrund der Vereinbarung Punkt- vor Strichrechnung dürfen wir zum Beispiel (e) auch schreiben als $r \cdot (a + b) = r \cdot a + r \cdot b$.

Beweis: Wir beweisen die Kommutativregel $a + b = b + a$. Sind $a = (a_1, \dots, a_n)$ und $b = (b_1, \dots, b_n)$ zwei (beliebige) Tupel aus $\mathbb{R}^n$ so gilt:

$$\begin{aligned} a + b &= (a_1, \dots, a_n) + (b_1, \dots, b_n) = (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n) \\ &= (b_1 + a_1, \dots, b_n + a_n) = (b_1, \dots, b_n) + (a_1, \dots, a_n) \\ &= b + a. \end{aligned}$$

Man erkennt: Die Kommutativregel gilt, weil sie bei den reellen Zahlen $\mathbb{R}$ gilt; die Regel überträgt sich. Die anderen sieben Rechenregeln beweist man analog. $\square$

Wir werden später weitere Rechenregeln und Eigenschaften von reellen Tupel kennenlernen.

Gegeben sind die reellen Tupel $a_1, a_2, \dots, a_r$ aus $\mathbb{R}^n$ und reelle Zahlen $s_1, s_2, \dots, s_r$. Dann heißt das reelle Tupel

$$s_1 a_1 + s_2 a_2 + \dots + s_r a_r$$

Linearkombination (lineare Kombination) von $a_1, a_2, \dots, a_r$. Die reellen Zahlen s_j heißen **Koeffizienten**. Das reelle Tupel a ist eine Linearkombination der reellen Tupel $a_1, a_2, \dots, a_r$, wenn gilt $a = s_1 a_1 + s_2 a_2 + \dots + s_r a_r$ für irgendwelche reelle Zahlen $s_1, s_2, \dots, s_r$.

Beispiel 1.3 Für $(2, -3, 4, 5)$ und $(0, 2, 7, -1)$ aus $\mathbb{R}^4$ ist

$$2(2, -3, 4, 5) + (-1)(0, 2, 7, -1) = (4, -8, 1, 11)$$

eine Linearkombination mit den Koeffizienten 2 und -1 . $\square$

Gegeben sind $r \in \mathbb{N}$ und reelle Tupel $a_1, a_2, \dots, a_r$ aus $\mathbb{R}^n$. Dann heißt die Menge aller Linearkombinationen

$$\{s_1 a_1 + s_2 a_2 + \dots + s_r a_r \mid s_1, s_2, \dots, s_r \in \mathbb{R}\}$$

lineare Hülle der Tupel $a_1, a_2, \dots, a_r$. Man schreibt $\text{Lin}(a_1, a_2, \dots, a_r)$ für diese Menge.

Beispiel 1.4 Für $(2, 1)$ aus $\mathbb{R}^2$ ist $\text{Lin}(2, 1) = \{s(2, 1) \mid s \in \mathbb{R}\}$ die Menge der Linearkombinationen des Tupels $(2, 1)$. Zum Beispiel sind $(4, 2) \in \text{Lin}(2, 1)$ und $(-8, -4) \in \text{Lin}(2, 1)$, aber $(1, 1) \notin \text{Lin}(2, 1)$. $\square$

Satz 1.2 Sind $r \in \mathbb{N}$ und reelle Tupel $a_1, a_2, \dots, a_r$ aus $\mathbb{R}^n$ gegeben. Dann ist die lineare Hülle $\text{Lin}(a_1, a_2, \dots, a_r)$ eine Teilmenge von $\mathbb{R}^n$, es ist also $\text{Lin}(a_1, a_2, \dots, a_r) \subseteq \mathbb{R}^n$.

Beweis: Sind $a_1, a_2, \dots, a_r$ aus $\mathbb{R}^n$, dann auch jedes Vielfache und auch die Summe. $\square$

1.2 Visualisierungen von reellen Tupeln

Die reellen Zahlen $\mathbb{R}$ können wir uns als Punkte auf einer Geraden vorstellen. Hierzu legt man fest, wo 0 und 1 liegen, dann entspricht jeder reellen Zahl $x \in \mathbb{R}$ ein Punkt auf dieser Geraden. (Zwischen $\mathbb{R}$ und $\mathbb{R}^1$ besteht nur ein formaler Unterschied.) Ganz ähnlich können wir uns reelle Zahlenpaare $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ als Punkte in einer Ebene vorstellen. Die waagrechte Gerade spielt dabei die Rolle von $\mathbb{R} \times \{0\} \subset \mathbb{R}^2$, die senkrechte Gerade die von $\{0\} \times \mathbb{R}$, siehe Bild 1.1. Zur Veranschaulichung von $\mathbb{R}^3$ zeichnet man ähnlich wie




Bild 1.1: Die Menge $\mathbb{R}$ (links) und die Menge $\mathbb{R}^2$ (rechts) visualisiert.

bei $\mathbb{R}^2$ die *Achsen* $\mathbb{R} \times \{0\} \times \{0\}$, $\{0\} \times \mathbb{R} \times \{0\}$ und $\{0\} \times \{0\} \times \mathbb{R}$, aber zweckmäßiger nur halb, sonst wird das Bild unübersichtlich.

Somit können wir uns die Menge $\mathbb{R}^2$ als Punkte in der Ebene vorstellen. Jede Menge von reellen Zahlenpaaren kann also als Menge von Punkten der Ebene aufgefasst werden. Umgekehrt kann man jeder Punktmenge der Ebene (geometrische Figur) als Menge von reellen Zahlenpaaren auffassen und rechnerisch behandeln. Das ist der Grundgedanke der *Analytischen Geometrie*.

In Bild 1.2 haben wir die Addition zweier reeller Paare und in Bild 1.2 die Multiplikation eines reellen Paares mit einer reellen Zahl dargestellt. Durch die Addition entsteht ein Parallelogramm mit den Eckpunkten zu den Paaren $(0, 0)$, (a_1, a_2) , (b_1, b_2) und $(a_1 + b_1, a_2 + b_2)$. Durch die reelle Multiplikation wird der Punkt zu (a_1, a_2) mit der reellen Zahl r gestreckt (gestaucht).

Ist $o_2 \neq a \in \mathbb{R}^2$, so entsprechen den reellen Paaren ra mit $r \in \mathbb{R}$ die Punkte auf der Geraden in der Ebene, die durch die Punkte zu o_2 und a geht. Der linearen Hülle $\text{Lin}(a)$ entspricht eine Ursprungsgerade in der Ebene, siehe Bild 1.3 links. Sind $o_2 \neq a \in \mathbb{R}^2$, $o_2 \neq b \in \mathbb{R}^2$ und ist a kein reelles Vielfaches von b , so entsprechen den reellen Paaren $ra + sb$ mit $r, s \in \mathbb{R}$ alle Punkte der Ebene. Der linearen Hülle $\text{Lin}(a, b)$ entspricht also die ganze Ebene.

Ist $o_3 \neq a \in \mathbb{R}^3$, so entsprechen den reellen Tripeln ra mit $r \in \mathbb{R}$ die Punkte auf der Geraden im Raum, die durch die Punkte zu o_3 und a geht. Der linearen Hülle $\text{Lin}(a)$




Bild 1.2: Addition (links) und reelle Multiplikation (rechts) in $\mathbb{R}^2$ visualisiert.

entspricht eine Ursprungsgerade im Raum. Ist $o_3 \neq a, b \in \mathbb{R}^3$ und ist a kein reelles Vielfaches von b , so entsprechen den reellen Tripeln $ra + sb$ mit $r, s \in \mathbb{R}$ die Punkte auf der Ebene im Raum, die durch die drei Punkte zu o_3 , a und b geht. Der linearen Hülle $\text{Lin}(a, b)$ entspricht eine Ursprungsebene im Raum.

Eine andere Möglichkeit ein reelles Tupel zu visualisieren besteht darin, dass wir eine gerichtete Strecke (Pfeil) vom Koordinatenursprung zum Punkt zeichnen. In diesem Fall haben die Punkte auf der gerichteten Strecke keine spezielle Bedeutung, siehe Bild 1.3 (rechts).




Bild 1.3: $\text{Lin}(a)$ visualisiert (links). $(2, 2)$, $(-2, -2)$, $(3, -1)$ als Pfeil visualisiert (rechts).

1.3 Weitere Bemerkungen und Hinweise

Bitte beachten Sie, dass wir das Pluszeichen (Summenzeichen, Additionszeichen) $+$ in zwei verschiedenen Bedeutungen verwendet haben und auch noch verwenden werden: reelle Zahl plus reelle Zahl, reelles Tupel plus reelles Tupel. Bitte beachten Sie, dass wir das Malzeichen (Produktzeichen, Multiplikationszeichen) $\cdot$ in zwei verschiedenen

Bedeutungen verwendet haben und auch noch verwenden werden: reelle Zahl mal reelle Zahl, reelle Zahl mal reelles Tupel.

Oft wird ein reelles geordnetes Tupel reeller Vektor genannt. In moderner Mathematik ist ein Vektor ein Element eines Vektorraumes. Vektorräume werden wir in Kapitel 4 studieren. In Kapitel 4 werden wir zeigen, dass die Menge $\mathbb{R}^n$ mit den beiden gewöhnlichen Verknüpfungen $+$ und $\cdot$ aus diesem Kapitel ein reeller Vektorraum ist. Dann ist es gerechtfertigt eine reelles geordnetes Tupel einen reellen Vektor aus $\mathbb{R}^n$ zu nennen. In Kapitel 4 werden wir noch mehr sehen: Die Menge $\mathbb{R}^n$ ist ein reeller Vektorraum der Dimension n , ja noch mehr, er ist der Prototyp der reellen Vektorräume der Dimension n .

Es ist M eine beliebige Menge. Jede Abbildung $\phi : M \times M \rightarrow M$ heißt *innere Verknüpfung auf M* . Somit ist die Tupeladdition eine innere Verknüpfung auf $\mathbb{R}^n$. Es sind M, N beliebige Mengen mit $M \neq N$. Jede Abbildung $\phi : N \times M \rightarrow M$ heißt *äußere Verknüpfung von M mit N* . Somit ist die reelle Multiplikation eine äußere Verknüpfung von $\mathbb{R}^n$ mit $\mathbb{R}$.

Bitte beachten Sie: Bilder haben oft nur eine symbolische Bedeutung; sie geben die Situation stark vereinfacht wieder. Trotzdem sind solche Bilder als Denk- und Anschauungshilfe nicht zu verachten.

Jetzt möchte ich Ihnen noch ein paar Literaturhinweise geben. Zur Linearen Algebra gibt es viele Bücher, zumal in fast jedem Buch über Mathematik ein Kapitel zur Linearen Algebra enthalten ist. Tiefer gehende theoretische Ergebnisse, weitere Anwendungen, Modelle und Aufgaben zur Linearen Algebra finden Sie in [5, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 22]. Die Renner unter den deutschsprachigen Büchern sind [3, 7, 11, 15]. Doch jetzt viel Erfolg bei den Aufgaben!

1.4 Aufgaben

1.1 Kreuzen Sie die wahre(n) Aussage(n) an. Es ist $n \in \mathbb{N}$. Dann besteht $\mathbb{R}^n$ aus

- | | |
|--|--|
| ☐ n reellen Zahlen. | ☐ n -Tupeln natürlicher Zahlen. |
| ☐ n -Tupeln reeller Zahlen. | ☐ Keine Aussage ist wahr. |

Lösung:

	×		
--	---	--	--

 (Spaltenweise)

1.2 Kreuzen Sie die wahre(n) Aussage(n) an. Es ist $\text{Lin}((1, 0), (0, 1))$ gleich

- ☐ $\mathbb{R}^2$.
- ☐ $\{r(1, 0) \mid r \in \mathbb{R}\}$.
- ☐ $\{r(0, 1) \mid r \in \mathbb{R}\}$.
- ☐ $\{r(1, 0) + r(0, 1) \mid r \in \mathbb{R}\}$.
- ☐ $\{r_1(1, 0) + r_2(0, 1) \mid r_1, r_2 \in \mathbb{R}\}$.

- ☐ $\{r_1(1, 0) + r_2(2, 0) \mid r_1, r_2 \in \mathbb{R}\}.$
☐ $\{r_1(2, 0) + r_2(0, -2) \mid r_1, r_2 \in \mathbb{R}\}.$
☐ $\{r_1(0, 0) + r_2(1, 0) + r_3(0, 1) \mid r_1, r_2, r_3 \in \mathbb{R}\}.$
☐ Keine Aussage ist wahr.

Lösung:

×				×		×	×	
---	--	--	--	---	--	---	---	--

1.3 Kreuzen Sie die wahre(n) Aussage(n) an. Der Menge $\text{Lin}((1, 1), (2, 2))$ entspricht geometrisch

- | | |
|---|--|
| ☐ eine Strecke.
☐ eine Gerade.
☐ eine Halbgerade.
☐ ein Kreis. | ☐ eine Ellipse.
☐ eine Ebene.
☐ einem Parallelogramm.
☐ Keine Aussage ist wahr. |
|---|--|

Lösung:

	×						
--	---	--	--	--	--	--	--

 (Spaltenweise)

1.4 Gegeben sind $a = (2, 1)$ und $b = (-1, 1)$ aus $\mathbb{R}^2$. Bestimmen Sie $a + b$ und visualisieren Sie die reellen Zahlenpaare.

Lösung: Es ist $a + b = (2, 1) + (-1, 1) = (1, 2)$. Für eine Visualisierung siehe Bild 1.4 (links).





Bild 1.4: Zu Aufgabe 1.4 (links) und Aufgabe 1.5 (rechts).

1.5 Geben Sie die Menge $\text{Lin}(1, 3) \subset \mathbb{R}^2$ an. Welcher geometrischen Figur entspricht diese Menge?

Lösung: Es ist $\text{Lin}(1, 3) = \{r(1, 3) \mid r \in \mathbb{R}\}$. Die dazugehörige geometrische Figur ist eine Ursprungsgerade mit der Steigung 3 in der Ebene. Siehe Bild 1.4 (rechts).

1.6 Gegeben sind $a = (-1, 2)$ und $b = (-3, -1)$ aus $\mathbb{R}^2$. Berechnen Sie $a + b$ und $a - 2b$.

Lösung: Es ist $a + b = (-1, 2) + (-3, -1) = (-1 - 3, 2 - 1) = (-4, 1)$ und $a - 2b = (-1, 2) - 2(-3, -1) = (-1, 2) - (-6, -2) = (-1 + 6, 2 + 2) = (5, 4)$.

1.7 Es sind $u = (1, -1, 0, 2) \in \mathbb{R}^4$, $v = (-1, 2, 1, 0) \in \mathbb{R}^4$ und $r = 2 \in \mathbb{R}$. Berechnen Sie $u + v$, ru und $u - v$.

Lösung: Es sind $u + v = (1, -1, 0, 2) + (-1, 2, 1, 0) = (1 + (-1), (-1) + 2, 0 + 1, 2 + 0) = (0, 1, 1, 2)$, $ru = 2(1, -1, 0, 2) = (2, -2, 0, 4)$ und $u - v = (2, -3, -1, 2)$.

1.8 Gegeben sind $a = (1, -3, 2, 4)$ und $b = (3, 5, -1, -2)$ aus $\mathbb{R}^4$. Berechnen Sie $a + b$, $5a$ und $2a - 3b$.

Lösung: Es ist $a + b = (1 + 3, -3 + 5, 2 - 1, 4 - 2) = (4, 2, 1, 2)$, $5a = ((5)(1), (5)(-3), (5)(2), (5)(4)) = (5, -15, 10, 20)$ und $2a - 3b = (2, -6, 4, 8) + (-9, -15, 3, 6) = (-7, -21, 7, 14)$.

1.9 Geben Sie die Mengen $\text{Lin}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)) \subseteq \mathbb{R}^4$ und $\text{Lin}((1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1)) \subseteq \mathbb{R}^5$ an.

Lösung: Es ist $\text{Lin}((1, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0)) = \{(r, s, 0, 0) \mid r, s \in \mathbb{R}\}$ und $\text{Lin}((1, 0, 0, 0, 0), (0, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1)) = \mathbb{R}^5$.

1.10 Es ist $o = (0, 0, 0, 0) \in \mathbb{R}^4$. Beweisen Sie die Rechenregel $a + o = a$ für alle $a \in \mathbb{R}^4$.

Lösung: Es ist $a + o = (a_1, a_2, a_3, a_4) + (0, 0, 0, 0) = (a_1 + 0, a_2 + 0, a_3 + 0, a_4 + 0) = (a_1, a_2, a_3, a_4) = a$ für jedes $a = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ aus $\mathbb{R}^4$. (Bitte beachten Sie. Wir haben im Beweis außer der Definition der Tupeladdition aus diesem Kapitel die Rechenregel $r + 0 = r$ für jede reelle Zahl r verwendet haben. Außerdem ist das Zeichen $+$ in zweifacher Bedeutung verwendet worden, als Tupeladdition in $\mathbb{R}^4$ und als gewöhnliche Addition zweier reeller Zahl.)

Sie sollten nun mit folgenden Begriffen umgehen können

Tupel, $\mathbb{R}^n$, Linearkombination, lineare Hülle.

2 Reelle Matrizen

Es sind m und n aus $\mathbb{N}$. Ein n -Tupel von m -Tupeln von Elementen aus $\mathbb{R}$

$$\left((a_{11}, \dots, a_{m1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn}) \right) \in \underbrace{\mathbb{R}^m \times \dots \times \mathbb{R}^m}_n$$

geschrieben in der Form

$$\begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

heißt **reelle Matrix der Ordnung** (m, n) . Die reellen Zahlen a_{ij} sind die **Einträge** oder **Komponenten** der Matrix. Das reelle n -Tupel $(a_{i1}, \dots, a_{in}) \in \mathbb{R}^n$ ist die **i -te Zeile** der Matrix für $i = 1 : m$ und das reelle m -Tupel $(a_{1j}, \dots, a_{mj}) \in \mathbb{R}^m$ ist die **j -te Spalte** der Matrix für $j = 1 : n$. Der erste Index i von a_{ij} wird **Zeilenindex** und der zweite Index j wird **Spaltenindex** genannt. Der Matrixeintrag a_{ij} steht in der i -ten Zeile und j -ten Spalte. Die natürliche Zahl m gibt die Anzahl der Zeilen und die natürliche Zahl n gibt die Anzahl der Spalten der Matrix an.

Beispiel 2.1 Die reelle Matrix $((1, 7), (\sqrt{2}, -3), (-2, \pi)) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2$ geschrieben in der Form

$$\begin{bmatrix} 1 & \sqrt{2} & -2 \\ 7 & -3 & \pi \end{bmatrix}$$

hat $m = 2$ Zeilen, $n = 3$ Spalten und $2 \cdot 3 = 6$ Einträge. Es ist $a_{11} = 1$, $a_{12} = \sqrt{2}$, $a_{13} = -2$, $a_{21} = 7$, $a_{22} = -3$ und $a_{23} = \pi$. Zum Beispiel ist $(1, \sqrt{2}, -2)$ die erste Zeile und $(-2, \pi)$ die dritte Spalte der Matrix. Die Ordnung der Matrix ist $(2, 3)$. $\square$

Die Matrixeinträge a_{ij} sind in diesem Buch fast immer reelle Zahlen, also $a_{ij} \in \mathbb{R}$ (oder natürlich Variablen, die für reelle Zahlen stehen). Gelegentlich ist es jedoch erforderlich, für die Matrixeinträge auch andere mathematische Objekte zuzulassen, zum Beispiel komplexe Zahlen, Funktionsterme oder Matrizen selbst.

Matrizen bezeichnen wir gewöhnlich mit großen lateinischen Buchstaben, zum Beispiel A , B , C , usw. Ist A eine reelle Matrix der Ordnung (m, n) , so schreiben wir dafür auch

$[a_{ij}]$ mit $i = 1 : m$ und $j = 1 : n$. Die Menge aller reellen (m, n) -Matrizen bezeichnen wir mit $\mathbb{R}^{m \times n}$; es gilt also

$$\mathbb{R}^{m \times n} = \{[a_{ij}] \mid a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 1 : m \text{ und } j = 1 : n\}.$$

Beispiel 2.2 Konstruieren Sie die Matrix $A = [a_{ij}]$ mit $a_{ij} = 3i - j^2$ für $i = 1 : 2$ und $j = 1 : 3$.

Lösung: Ist $a_{ij} = 3i - j^2$, dann ist $a_{11} = (3)(1) - 1^2 = 3 - 1 = 2$, $a_{12} = -1$, $a_{13} = -6$, $a_{21} = 5$, $a_{22} = 2$ und $a_{23} = -3$. Also ist

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -6 \\ 5 & 2 & -3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}. \quad \square$$

Satz 2.1 Sind $A = [a_{ij}]$ und $B = [b_{ij}]$ aus $\mathbb{R}^{m \times n}$, so gilt $A = B$ genau dann, wenn $a_{ij} = b_{ij}$ für $i = 1, 2, \dots, m$ und $j = 1, 2, \dots, n$ ist.

Beweis: Aus der Mengenlehre ist bekannt, dass zwei n -Tupel genau dann gleich sind, wenn ihre entsprechenden Koordinaten (Komponenten) gleich sind. Damit gelten folgende Überlegungen. Es ist $A = B$ genau dann, wenn

$$((a_{11}, \dots, a_{m1}), \dots, (a_{1n}, \dots, a_{mn})) = ((b_{11}, \dots, b_{m1}), \dots, (b_{1n}, \dots, b_{mn}))$$

genau dann, wenn $(a_{1j}, \dots, a_{mj}) = (b_{1j}, \dots, b_{mj})$ für $j = 1 : n$ genau dann, wenn $a_{ij} = b_{ij}$ für $i = 1 : m, j = 1 : n$. $\square$

Beispiel 2.3 Die beiden Matrizen

$$\begin{bmatrix} 1 & x \\ y & -2 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix}$$

sind genau dann gleich, wenn $x = -1$ und $y = 2$ ist. $\square$

Besteht eine Matrix aus einer einzigen Spalte, so heißt sie **Spaltenmatrix**, analog wird eine Matrix mit nur einer Zeile als **Zeilenmatrix** bezeichnet. Eine $(1, 1)$ -Matrix ist sowohl Zeilen- als auch Spaltenmatrix und damit einfach eine reelle Zahl; man schreibt dann statt $[a]$ auch einfach a (Abschnitt 2.3). Für Spaltenmatrizen verwenden wir auch kleine lateinische Buchstaben a, u, v, x, y , usw. Da es nicht notwendig ist, ihre Einträge doppelt zu indizieren, können wir die Spaltenmatrix a mit m Einträgen auch als

$$a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$$

schreiben. Mit $\mathbb{R}^{m \times 1}$ bezeichnet man die Menge der Spaltenmatrizen mit m reellen Einträgen, und mit $\mathbb{R}^{1 \times n}$ die Menge der Zeilenmatrizen mit n reellen Einträgen.

2.1 Spezielle Matrizen

Vertauscht man Zeilen und Spalten einer Matrix $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$, so erhält man die **transponierte Matrix** $A^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$ mit n Zeilen und m Spalten: $A^T = [a_{ji}]$. Hierbei ist $i = 1 : m$ und $j = 1 : n$.

Beispiel 2.4 Die Matrix

$$a = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 1} \quad \text{ist eine Spaltenmatrix und} \quad a^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{1 \times 2}$$

ist ihre Transponierte, sie ist eine Zeilenmatrix. Die Transponierte der Matrix

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2} \quad \text{ist die Matrix} \quad B^T = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 3}.$$

□

Eine Matrix A mit n Zeilen und n Spalten heißt **quadratische Matrix der Ordnung n** . Ist eine quadratische Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ gegeben, dann bilden die Einträge $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ die **Hauptdiagonale** von A .

Die Matrix

$$O_{mn} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{m \times n},$$

deren sämtliche Einträge Null sind, heißt **Nullmatrix**. Für die Nullmatrix aus $\mathbb{R}^{n \times n}$ schreibt man statt O_{nn} oft kurz O_n . Die Indizes kann man auch weglassen, wenn die Größe klar ist.

Eine Matrix $D = [d_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ist eine **Diagonalmatrix**, wenn $d_{ij} = 0$ für $i \neq j$ gilt. Ist $n = m$, so hat eine Diagonalmatrix die folgende Struktur

$$D = \begin{bmatrix} d_{11} & & & \\ & d_{22} & & \\ & & \ddots & \\ & & & d_{nn} \end{bmatrix}.$$

Vereinbarung: Schreiben wir in einer Matrix die Einträge nicht explizit, so steht dafür die Zahl Null.

Beispiel 2.5 Welche der folgenden sechs Matrizen sind Diagonalmatrizen?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Lösung: Bis auf die letzte Matrix F sind alle Matrizen Diagonalmatrizen. $\square$

Eine quadratische Diagonalmatrix $E \in \mathbb{R}^{n \times n}$, deren Diagonaleinträge alle gleich 1 sind, heißt **Einheitsmatrix**:

$$E = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{bmatrix}.$$

Um die Ordnung der Einheitsmatrix aus $\mathbb{R}^{n \times n}$ zu deutlich hervorzuheben, schreiben wir oft E_n statt E .

Beispiel 2.6 Für $n = 2$ und $n = 3$ sind

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2} \quad \text{und} \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

die Einheitsmatrizen. $E_1 = [1] = 1$ ist die Einheitsmatrix aus $\mathbb{R}^{1 \times 1}$. (Zur Gleichung $[1] = 1$, siehe Abschnitt 2.3) $\square$

Eine Matrix $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist **symmetrisch**, wenn sie gleich ihrer Transponierten ist $A^T = A$.

Beispiel 2.7 Zeigen Sie, dass die Matrix

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

symmetrisch ist.

Lösung: Es ist

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} = A,$$

also ist die Matrix A symmetrisch. $\square$

Eine Matrix $U = [u_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist eine **obere Dreiecksmatrix**, wenn gilt $u_{ij} = 0$ für $i > j$. Eine Matrix $L = [l_{ij}] \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ist eine **untere Dreiecksmatrix**, wenn gilt $l_{ij} = 0$ für $i < j$.

Beispiel 2.8 Welche der folgenden drei Matrizen sind obere Dreiecksmatrizen?

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 8 & -9 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Lösung: Alle drei Matrizen sind obere Dreiecksmatrizen. □

2.2 Rechnen mit Matrizen

Es sind $m, n \in \mathbb{N}$, $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $B = [b_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$. Dann ist

$$A \oplus B = \begin{bmatrix} a_{11} + b_{11} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{bmatrix}$$

die **Summe** der Matrizen A und B . Die Verknüpfung oder Operation $\oplus$ heißt **Matrizenaddition** (**Addition von Matrizen**).

Sind A und B also zwei Matrizen gleicher Ordnung, so ist ihre Summe diejenige Matrix, die durch Addition der einander entsprechenden Einträge entsteht. Für das Matrizenadditionszeichen $\oplus$ verwendet man gewöhnlich das Additionszeichen $+$ der reellen Zahlen. Analog verfährt man für die anderen Zeichen der Matrizenverknüpfungen.

Beispiel 2.9 Berechnen Sie die Summe der Matrizen

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

Lösung: Die Summe ist

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+0 & 2+2 & 3+(-4) \\ -1+(-2) & 4+1 & 2+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & -1 \\ -3 & 5 & 5 \end{bmatrix}. \quad \square$$

Die Matrizenaddition ist eine Abbildung von $\mathbb{R}^{m \times n} \times \mathbb{R}^{m \times n}$ nach $\mathbb{R}^{m \times n}$ mit $(A, B) \mapsto A + B$. Eine (m, n) -Matrix plus eine (m, n) -Matrix ergibt eine (m, n) -Matrix.

Es sind $m, n \in \mathbb{N}$, $A = [a_{ij}] \in \mathbb{R}^{m \times n}$ und $r \in \mathbb{R}$. Dann ist

$$r \odot A = \begin{bmatrix} r \cdot a_{11} & \cdots & r \cdot a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ r \cdot a_{m1} & \cdots & r \cdot a_{mn} \end{bmatrix}$$

das **skalare Matrixprodukt** des Skalars (der reellen Zahl) r mit der Matrix A . Die Verknüpfung oder Operation $\odot$ heißt **Multiplikation** einer Matrix mit einem Skalar (einer reellen Zahl).

Das skalare Matrixprodukt ist diejenige Matrix, die durch Multiplikation jedes Eintrages von A mit dem Skalar r entsteht. Statt $r \odot A$ schreibt man $r \cdot A$ oder rA .

Beispiel 2.10 Berechnen Sie für $r = 2$ und

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

die Matrix rA .

Lösung: Es ist

$$rA = 2 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 9 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 & 2 \cdot 3 & 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 1 & 2 \cdot 9 & 2 \cdot 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 8 \\ 2 & 18 & 14 \end{bmatrix}. \quad \square$$

Die skalare Multiplikation ist eine Abbildung $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{m \times n}$ mit $(r, A) \mapsto rA$. Eine reelle Zahl mal eine (m, n) -Matrix ergibt eine (m, n) -Matrix.

Gegeben sind die Matrizen $A_1, A_2, \dots, A_r$ derselben Größe und reelle Zahlen $c_1, c_2, \dots, c_r$. Dann heißt die Matrix

$$c_1 A_1 + c_2 A_2 + \cdots + c_r A_r$$

Linearkombination (lineare Kombination) von $A_1, A_2, \dots, A_r$. Die reellen Zahlen c_j heißen **Koeffizienten**. Die Matrix A ist eine Linearkombination der Matrizen $A_1, A_2, \dots, A_r$, wenn gilt $A = c_1 A_1 + c_2 A_2 + \cdots + c_r A_r$ für irgendwelche reelle Zahlen $c_1, c_2, \dots, c_r$.

Beispiel 2.11 Für

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 9 & 7 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 \\ -1 & 3 & -4 \end{bmatrix} \quad \text{ist}$$

$$2A + (-1)B = 2 \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 1 & 9 & 7 \end{bmatrix} + (-1) \begin{bmatrix} 0 & 2 & 7 \\ -1 & 3 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 1 \\ 3 & 15 & 18 \end{bmatrix}$$

eine Linearkombination von A und B mit den Koeffizienten 2 und -1 . $\square$